

本情報は箱に表示されております。

ご使用前に、この説明文をよくお読み下さい。  
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

平成23年11月改訂

第2類医薬品

# イチジク<sup>かんちょう</sup>浣腸<sup>®</sup>20

## 特徴

今すぐに出したいお子様の便秘に。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

連用しないで下さい。

(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになります。)



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血
- (5) 次の診断を受けた人。

心臓病

2. 2~3回使用しても排便がない場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## その他の注意

次の症状があらわれることがあります。

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

## 効能・効果

便秘

## 用法・用量


**6歳以上12歳未満** 1回1個(20g)を直腸内に注入して下さい。  
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。

[2本目をご使用の際は、1時間あけた方が効果的です]

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。  
(使用後すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。)
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい。
- (5) 冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。
- (6) 浣腸にのみ使用して下さい。(内服しないで下さい。)

### 【イチジク浣腸の使い方】



- ノズルを真上に向け、薬液を少し押し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。

### 成分・分量

本品1個(20g)中 日局グリセリン……………10.00g  
添加物…ベンザルコニウム塩化物含有。 溶剤…精製水使用。

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 20g×2コ入り

### お問い合わせ先

---

イチジク製薬株式会社 お客様相談室

電話番号：03-3829-8214(直通)

受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

---

## 製造販売元

---



イチジク製薬株式会社

東京都墨田区東駒形4-16-6

(日本製)

便秘・浣腸について

詳しくは

イチジク浣腸

検索

<http://www.ichijiku.co.jp>

(独) 医薬品医療機器総合機構

副作用救済制度

☎ 0120-149-931